

文章编号: 1000-3142(2000) 02-0144-05

广西植物新资料

阎丽春¹, 覃海宁²

(1. 中国科学院西双版纳热带植物园, 云南昆明 650223; 2. 中国科学院植物研究所标本馆, 北京 100093)

摘要: 报道了广西植物分布新记录属1个, 新记录种19个。

关键词: 广西; 新记录; 植物

中图分类号: Q948.5 (267) 文献标识码: A

Some new recorded plants from Guangxi, China

YAN Li-chun¹, QIN Hai-ning²

(1. Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, the Chinese Academy of Sciences, Kunming 650223, China;
2. Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China)

Abstract: 1 genus, 19 species collected from Guangxi are reported as new records to this region.

Key words: Guangxi; new record; plant

1998年春季和秋季, 笔者先后参加了中国科学院植物研究所主持的中科院科考项目对桂西的植物资源调查活动, 并负责其中那坡县植物区系的研究。笔者在有关的标本鉴定中发现了一些广西过去未曾记录过的植物, 现加以整理后形成此文。本文引用的标本绝大部分是该次考察活动所采, 部分标本是1989年华南植物研究所红水河考察队所采, 还有一号标本是中英考察队所采。以上标本均收藏于中科院植物研究所标本馆 (PE)。

木兰科 Magnoliaceae

馨香玉兰

Magnolia odoratissima Law et R. Z. Zhou in Bull. Bot. Res. (Harbin) 6 (2) : 139, pl.

1. 1986; Fl. Reip. Popul. Sin. 30 (1): 115, fig. 27. 1996.

广西: 那坡县, 百都乡, 弄化村; 石灰岩石山, 海拔1 300 m。常绿乔木, 树高10 m, 果木质, 生枝顶。1998年11月8日, 中科院考察队 (覃海宁、张明理等) 2483 (PE)。

分布: 云南 (广南, 西畴)。广西首次记录。

收稿日期: 1999-06-07

作者简介: 阎丽春 (1973-), 女, 硕士, 植物分类学专业, 从事种子植物区系地理学的研究工作。

基金项目: 中国科学院生物分类区系特别支持费重大项目: 资环“九七”(1-3)。

http://w

模式标本采自云南西畴。

腊梅科 Calycanthaceae

西南腊梅

Chimonanthus campanulatus R. H. Chang et C. S. Ding in Acta Phytotax. Sin. **18** (3) : 330, fig. 2. 1980; Sylva Sin. **2**: 1175, fig. 526: 1~11. 1985.

广西: 那坡县, 龙合乡, 善合村, 规连屯; 石灰岩石山, 山坡, 海拔950 m。灌木, 树高4 m, 花被淡黄色。1998年11月10日, 中科院考察队 (覃海宁、张明理等) 2547 (PE)。

分布: 云南 (麻栗坡, 禄劝, 会泽)。广西首次记录。

模式标本采自云南禄劝。

荨麻科 Urticaceae

竹叶冷水花

Pilea ambusifolia C. J. Chen in Bull. Bot. Res. (Harbin) **2** (3): 95, pl. 7 (4~6). 1982; Fl. Reip. Popul. Sin. **23** (2): 127, fig. 28: 1~3. 1995.

广西: 那坡县, 平孟镇, 念井村; 石灰岩石山, 山坡, 灌丛, 海拔900 m。1997年4月29日, 中英考察队 ASBK283 (PE)。

分布: 贵州西南部, 生于崖壁上。广西首次记录。

模式标本采自贵州关岭。

山茶科 Theaceae

大杨桐

Adinandra grandis L. K. Ling (Icon. Corm. Sin. Suppl. **2**: 477. 1983, in Clavi, nom. nud.) ; Fl. Reip. Popul. Sin. **50** (1) : 34, fig. 11: 1~7, Addenda 190. 1998.

广西: 那坡县, 百都乡, 弄布村; 山地, 山谷, 海拔1 200 m。小乔木, 树高4 m, 花苞黄色。1989年4月29日, 华南植物研究所红水河考察队952 (PE)。

分布: 云南 (元阳县和金平县), 老挝也有。广西首次记录。

模式标本采自云南元阳县。

葡萄科 Vitaceae

毛三裂蛇葡萄

Ampelopsis delavayana Planch. var. **setulosa** (Diels et Gilg) C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. **2** (1) : 48. 1996; Fl. Reip. Popul. Sin. **48** (2): 44. 1998. — *A. aconitifolia* Bunge var. *setulosa* Diels et Gilg in Bot. Jahrb. **29**: 465. 1900.

广西: 那坡县, 城厢镇, 中强村, 弄内屯; 山地, 山坡, 海拔900 m。攀援木质藤本, 果熟时蓝色。1998年10月30日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1802 (PE)。

分布: 陕西, 甘肃, 河南, 河北, 四川, 贵州, 云南。广西首次记录。

模式标本采自贵州贵阳。

柔毛草崖藤

Tetrastigma apiculatum Gagnep. var. **pubescens** C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. **1** (4): 314. 1995; Fl. Reip. Popul. Sin. **48** (2): 96. 1998.

广西: 那坡县, 平孟镇, 旧村, 那定屯; 山地, 山坡, 密林, 海拔450 m。1998年4月13日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 539 (PE)。

分布: 云南, 海南。广西首次记录。

模式标本采自云南金平。

茄科 Solanaceae

酸浆

Physalis alkekengi L. Sp. Pl. 183. 1753; Fl. China **17**: 311. 1994.

广西: 那坡县, 城厢镇; 山地, 山坡, 海拔850 m。1998年10月24日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1384 (PE)。

分布: 甘肃, 贵州, 河北, 河南, 湖北, 山西, 四川, 云南; 俄罗斯, 巴基斯坦, 西南亚, 欧洲等地也有分布。广西首次记录。

模式标本采自意大利。

禾本科 Poaceae

甜茅

Glyceria acutiflora Torr. subsp. **japonica** (Steud.) T. Koyama et Kawano in Can. Journ. Bot. **42** (7): 868~860, t. 5. fig. 40 et 7. 1964. —*Hemibromus japonicus* Steud. Syn. Pl. Glum. Pt. 1, 317. 1854.

广西: 那坡县, 德孚保护区; 山地, 田野, 海拔1 100 m。1989年4月27日, 华南植物研究所红水河考察队217。

分布: 河南, 浙江, 江苏, 福建, 江西, 湖南, 四川; 朝鲜和日本也有。属和种在广西是首次记录。

模式标本采自日本。

海南柳叶箬

Isachne hainanensis Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 23, pl. 2. 1965; Fl. Reip. Popul. Sin. **10** (1): 191, pl. 6~11. 1990.

广西: 那坡县, 城厢镇, 中强村; 山谷, 草地, 海拔980 m。直立草本, 小穗紫色。1998年10月30日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1778 (PE)。

分布: 广东, 海南。广西首次记录。

模式标本采自海南崖县。

莎草科 Cyperaceae

华南苔草

Carex austrosinensis Tang et Wang ex S. Y. Liang in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 23, pl.

2. 1965.

广西: 那坡县, 城厢镇, 永靖村; 石灰岩石山, 灌丛, 海拔1 100 m。1998年4月12日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 472 (PE); 坡荷乡, 善合屯, 山坡, 密林, 海拔1 000 m。1998年4月17日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 815 (PE)。

分布: 广东。广西首次记录。

模式标本采自广东云浮。

肿喙苔草

Carex oedorrhampha Nelm es in Kew Bull. 659. 1939; Raymend in Natur. Canad. **82**: 161, 1995 et in Mem. Jard. Bot. Montr. **53**: 83, 1959, excl. var.

广西: 那坡县, 德孚自然保护区; 山地, 山谷, 水旁, 海拔1 100 m。1998年4月9日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 201 (PE)。

分布: 广东, 云南。也分布于喜马拉雅东部, 以及越南, 泰国, 印度尼西亚。广西首次记录。

模式标本采自锡金。

四川莎草

Cyperus szechuanensis T. Koyama in Jap. Journ. Bot. **15**: 182. 1956.

广西: 那坡县, 德隆乡; 草地, 海拔700 m。直立草本, 小穗绿色。1998年10月29日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1744 (PE)。

分布: 四川。广西首次记录。

模式标本采自四川。

矮红鳞扁莎

Pycnus sanguinolentus (Vahl) Nees form. **humilis** (Miq.) L. K. Dai in Fl. Reip. Popul. Sin. **11**: 171. 1961. — *Cyperus eragrostis* Vahl var. *humilis* Miq. Fl. Ind. Br. **3**: 257. 1859.

广西: 那坡县, 城厢镇; 田间, 湿地, 海拔850 m。直立草本, 小穗褐色。1998年10月25日, 中科院考察队 (李振宇、阎丽春等) 1534、1513 (PE)。

分布: 山西, 河南; 中亚至印度尼西亚。广西首次记录。

模式标本采自印度尼西亚。

百球 草

Scirpus rosthonii Diels in Bot. Jahrb. **29**: 228. 1901; Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 253. 1903.

广西: 那坡县, 下华乡, 规弄山; 山地, 山谷, 水旁, 海拔1 200 m。1998年4月15日, 中科院考察队 (覃海宁、王印政等) 655 (PE)。

分布: 浙江, 湖北, 福建, 广东, 四川, 重庆, 云南。广西首次记录。

模式标本采自重庆南川金佛山。

百合科 Liliaceae

富宁菝葜

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.
Smilax fooingensis Wang et Tang in Fl. Reip. Popul. Sin. **15**: 229. 1978.

广西：那坡县，城厢镇，永靖村；石灰岩石山，海拔1 100 m。1998年4月12日，中科院考察队（覃海宁、王印政等）508（PE）。

分布：云南。广西首次记录。

模式标本采自云南富宁。

长叶菝葜

Smilax lanceifolia Roxb. var. **lanceolata** (Norton) T. Koyama in Quart. Journ. Taiwan Mus. **13**: 26. 1960. — *S. cocculoides* Warb. var. *lanceolata* Norton in Sargent, Pl. Wils. **3**: 11. 1916.

广西：那坡县，德孚自然保护区；山地，山谷，海拔1 300 m。灌木，果绿色。1989年5月6日，华南植物研究所红水河考察队332（PE）。

分布：云南南部（临沧，思茅，金平，屏边，文山）。广西首次记录。

模式标本采自云南思茅。

兰科 Orchidaceae

白花贝母兰

Coelogyne leucantha W. W. Smith. in Notes Bot. Gard. Edinb. **13**: 198. 1921.

广西：那坡县，百都乡，弄布村；山地，山顶，海拔1 100 m。草本，花白色。1989年5月22日，华南所红水河考察队964（PE）。德孚保护区旧场；山地，山谷，海拔1 300 m；草本。1989年4月26日，华南植物研究所红水河考察队121（PE）。

分布：四川西南部，云南西部至东南部。广西首次记录。

模式标本产于缅甸与云南西部交界处。

舌唇槽舌兰

Holcoglossum lingulatum (Aver.) Aver. in Consp. Sosud. Rast. Fl. Vietnam **1**: 110. 1990, et Iden, Guide Vietnam Orch. : 345. 1994. — *H. kimballianum* var. *lingulatum* Aver. in Bot. Zhurn. **73** (3): 426. 1998.

广西：那坡县，百都乡，弄化村；石灰岩石山，海拔1 300 m。披散草本，花瓣粉红色。1998年11月8日，中科院考察队（覃海宁、张明理等）2496（PE）。

分布：云南（麻栗坡），越南。广西首次记录。

模式标本采自越南。

尖叶石仙桃

Pholidota missionarionem Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, **3**: 145. 1931.

广西：那坡县，城厢镇，永靖村；山地，灌丛，海拔1 100 m。直立草本。1998年4月12日，中科院考察队（覃海宁、王印政等）473（PE）。

分布：云南，贵州（西南部）。广西首次记录。

模式标本采自贵州平坝。

标本鉴定曾获以下专家惠助：李振宇、梁松筠、戴伦凯、刘 亮、陈家瑞、郎楷永、吉占和、张志耘、林 祁、陈心启、李振宇教授对原稿提出宝贵修改意见。谨此一并致谢。