文章编号: 1001-9499 (2004) 02-0006-02

提高团花种子萌发率的方法*

周双云 张丽霞 张远辉

(中科院西双版纳热带植物园, 云南 勐腊 666303)

摘要: 温水浸种可以提高团花种子种皮的透水性, 促进种子萌发, 提高发芽率, 其中以 50℃、60℃ 的温水处理效果最好, 温水处理时间长短无显著差异, 采用不同浓度的 GA₃ 处理团花种子可以打破种子休眠, 促使种子萌发, 且以 100~200 μl/l 的浓度处理效果较好。

关键词: 团花; 种子; 萌发

中图分类号: S 722.1⁺4

文献标识码: A

团花 (*Anthocephalus chinensis*) 又名黄梁木, 是茜草科的一种常绿或半落叶乔木。在印度、越南等国有分布, 我国的云南、广西省南部亦有自然分布, 是一种热带速生树种。西双版纳地区野生团花生长十分迅速, 据测定, 14 年生的团花树高为 23~25 m, 胸径为 53.8 cm, 单株总材积为 2.16 m³, 平均每年材积生长量达 0.154 m³, 其中生长最快的第 10 年, 当年材积量达到 0.288 m³, 10 龄以后其高和直径的增长逐渐缓慢下来, 而材积量则仍能维持在一定水平上。由于团花具有生长快、材质良好的特性, 已引起我国林业部门的注意, 目前已在广东、广西、福建、云南等地栽培, 且效果显著。

团花种子具有种皮强制性和生理休眠特性, 为一种兼性生理休眠类型^[1], 并含有萌发抑制物质脱落酸^[2], 不经处理种子萌发率较低, 为寻找提高团花种子萌发率的有效方法, 我们做了一系列种子萌发试验, 现将结果报道如下。

1 试验材料与方方法

1.1 试验地概况与供试材料

种子萌发试验于 2001 年 10 月在中国科学院西双版纳热带植物园的苗圃内进行, 该苗圃地处 105°25'E, 21°44'N, 海拔高度 560 m。试验所用材料为 2000 年 11 月、2001 年 10 月采于野外逸生的团花林的果实。果实经堆沤至烂, 再将铁丝制的筛子放于有水的容器中, 将果实在筛子上搓洗, 使种子落入水中, 然后用布过滤, 凉干后用 40 目或 60 目的分样筛获得种子。

1.2 试验方法

试验分 2 组进行, 第 1 组研究不同温水浸种对种子萌发率的影响, 对 2000 年采集并密闭于室温的团花种子分别采用 40℃、50℃、60℃、70℃ 的温水浸种 24 h、48 h, 以冷水处理为对照。第 2 组研究不同浓度赤霉素 (GA₃) 处理对种子萌发率的影响, 对 2001 年采集的新鲜种子用 50, 100, 150, 200 μl/l 浓度的 GA₃ 分别处理 24 h, 48 h, 以清水处理为对照。

以上处理各设 3 个重复, 每个处理播种 50 粒, 播种基质为经高温消毒的苗圃营养土 (生土: 泥炭土: 腐质土 = 1:1:1), 播种房内用电灯加温, 日平均温度在 25℃ 左右。种子萌发后做逐日记录。

2 结果与分析

2.1 温水浸种对萌发率的影响

从图 1 可以看出, 温水浸种在一定程度上可以促进团花种子萌发, 提高萌发率, 其中以 50℃、60℃ 的温水处理效果最好, 而 70℃ 的温水处理对种子发芽不仅没有促进作用, 而且会烫伤种子; 浸种时间对萌发率无显著影响。

2.2 赤霉素对种子萌发率的影响

从图 1 及图 2 可以看出, 鲜种子用清水浸种 24 h, 萌发率只有 6%, 经过近 1 年室温贮藏, 萌发率提高为 35.56%, 而用 GA₃ 处理种子后, 种子萌发率最高可达到 66.66%, 说明 GA₃ 对打破团花种子休眠, 促进种子萌发有显著作用, 其中

* 基金项目: 热带植物种质资源引种保存及资源植物研究 (万种植物园) 重大项目 (WK2000-7) 资助

以 100~200 $\mu\text{l/l}$ 的处理效果最佳。

图 1 温水浸种对种子萌发的影响

图 2 不同浓度的 GA_3 处理对种子萌发率的影响

3 讨论

3.1 团花种子的成熟期为 10~12 月份, 有少数延迟到翌年 2~3 月份, 这时正是秋冬低温时期, 成熟的种子呈休眠状态, 这是一种很好的生态适

应性, 但种子不容易萌发, 必须经过一段时间的贮藏, 萌发率才能逐步提高, 这给育苗带来了很大的困难。而采用 100~200 $\mu\text{l/l}$ GA_3 处理团花种子, 可以打破种子休眠, 促使其萌发。

3.2 团花种子贮藏的温度和时间对其萌发率有极显著的影响, 低温贮藏的团花种子具有较高的萌发率, 在贮藏 0~150 天之间, 种子萌发率由较低水平逐渐上升, 休眠程度随贮藏过程的进行逐渐降低, 至 150 天种子解除休眠, 150~420 天一直在较高水平上波动。而在室温贮藏条件下, 种子贮藏至 150 天时发芽率最高, 60~270 天之间的萌发率比较接近, 在较高水平上波动, 而贮藏 300 天后种子萌发率极显著地降低^[1]。本次第 1 组试验中所用种子为室温贮藏 330 天的种子, 因此发芽率不是太高, 但可以说明采用 50~60 $^{\circ}\text{C}$ 的温水浸种, 可有效提高团花种子的种皮透水性, 提高种子的萌发率。

参 考 文 献

- [1] 殷寿华, 许再富等. 团花种子贮藏生命力变化与激素调控研究. 热带植物研究论文报告集 [M]. 昆明: 云南大学出版社, 1996
- [2] 陈耀武, 邓万华等. 团花种子和果实中抑制物质的研究 [J]. 植物生理学报, 1985, 11 (1): 93

第 1 作者简介: 周双云 (1965-), 湖南衡阳人, 高级实验师, 主要从事植物引种驯化工作。

收稿日期: 2003-05-06

Methods of Seed Germination Enhancement of *Anthocephalus chinensis*

ZHOU Shuangyun

(Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, CAS, Mengla Yunnan 666303)

Abstract This paper described two different methods to acquire preferable germination percentages respectively for the dormant stored seeds and freshly collected seeds of *Anthocephalus chinensis*. The results showed that the germination capacity of stored seeds after 330 days can be enhanced by a pre-treatment of immersed in warm water. Seeds treated by 50 $^{\circ}\text{C}$ and 60 $^{\circ}\text{C}$ water immersion obtained germination of 64.66% and 62% while the control was only 38%. There were no significant differences between 24h and 48h treatments in the study. Freshly collected seeds are dormant with only 6% germination. However, adoption of certain concentration GA_3 pretreatment is effective to break their dormancy and promote germination ability. Our research shows that 100~200 $\mu\text{l/l}$ GA_3 solution is suitable for promoting fresh seed germination.

Key words *Anthocephalus chinensis*; Seed germination; Pretreatment; GA_3