



图片说明

- 1.4. 火烧花
2. 火烧花的蒴果
3. 美味佳肴火烧花



热带植物

火烧花

文·图 © 周亮 黄自云 黄建平

在云南省西南部的热带雨林里,火烧花 (*Mayodendron igneum*) 不仅具有典型的老茎生花现象,而且其花朵还是当地人们经常食用的野生蔬菜。

火烧花为紫葳科火烧花属中型乔木,高达15米,胸径15~20厘米;树皮光滑,嫩枝具长椭圆形白色皮孔。大型奇数2回羽状复叶,长达60厘米,中轴圆柱形,有沟纹;小叶卵形至卵状披针形,长8~12厘米,宽2.5~4厘米,顶端长渐尖,基部阔楔形,偏斜,全缘,两面无毛。花序有花5~13朵,组成短总状花序,着生于老茎或侧枝上,花序梗长约2.5~3.5厘米;花梗长5~10毫米。花萼呈佛焰苞状,外面密被微柔毛。花冠橙黄色至金黄色,筒状,基部微收缩,长6~7厘米,直径1.5~1.8厘米,檐部裂片半圆形,反折。花丝长约4.5厘米,基部被细柔毛,花药个字形着生,药2室,药隔顶端延伸成芒尖,花药及柱头微露出花冠管外。蒴果长线形,下垂,长达45厘米,粗约7毫米,裂瓣2,薄革质,隔膜细圆柱形,木栓质。种子卵圆形,薄膜质,具白色透明的膜质翅,连翅长约13~16毫米。花期2~5月,果期5~9月。

一进入花期,火烧花便在树干上或多年生的大枝上,密密麻麻、挤挤攘攘地布满一簇簇、一丛丛花朵,数量繁多,数不胜数,蔚为壮观;且那花朵大小如儿童手指,状如小喇叭,通体金黄,异常美丽。若有风过,成千上万的花朵就会飘飘洒洒地落遍地下,如碎金铺地,吸引附近地区的妇女们纷纷前来拾花,以回去做成盘中美味。

火烧花清香微苦,用开水焯过,再加些辣椒豆瓣爆炒即可成一道佳肴。此菜香气袭人,色泽金黄,盛在白底青花磁盘里,未食用之前就已是一道靓丽的视觉盛宴了!吃起来呢?——鲜香可口、柔而微韧、淡苦宜人。其实,也可以根据各人口味不同,按照各人喜好添加不同的佐料,从而将这道菜烹制出不同的味道。在西双版纳傣医中,火烧花亦占有一席之地。傣医认为,它的树皮味苦,性凉,可入风、水塔,具有清热解毒、祛风利水、杀虫止痒的功效,可用于治疗牙痛、风寒湿痹、肢体关节肿痛、屈伸不利、疔疮痛疽脓肿、疥癣、漆树过敏等症。

火烧花分布于云南南部、台湾、广东、广西。常生于干热河谷、低山丛林,海拔150~1900米。在越南、老挝、缅甸、印度也有分布。

火烧花树形优美、花叶俱佳,具有极高的观赏性,无花时羽毛似的绿叶浓密茂盛,开花时绿叶全无,全树好似闪烁着无数火苗,等到花期之后才慢腾腾地又长出新的叶片来,正所谓“先花后叶”也,这在正值旱季少花的热带雨林里显得极为醒目。目前,作为优秀园林观赏树种之一,我国南方热带和亚热带地区可以将火烧花引入城市,或作行道树,或作庭院点缀。

火烧花的繁殖方法有播种、压条、扦插等。以播种为主,在其蒴果成熟时,采下果实放在无风处晾干或晒干,裂后轻轻敲出种子,在气候温暖时可播种,由于种子细小,一般采用拌沙(拌土)撒播,种子播种后,保持播种床湿润,一般1周左右发芽,发芽率为60%~80%。幼苗生长50~60天,苗茎稍木质化时,即可移至大田栽培,1~2年可出圃,3~5年可开花。📖

周亮 南京宿根植物园园长。