Deformyl Corymine 类型的四个吲哚生物碱 ^{13}C NMR 的研究

贺湘* 李朝明** 周韵丽

(中国科学院上海药物研究所, 上海)

本文报道了四个 deformyl corymine 的吲哚生物碱的 ^{13}C 谱的归属, 对一些取代基效应进行了讨论; 并应用了 C—H COSY 及选择去偶技术, 指认 ^{13}C 信号。

利用碳谱, 前人已对许多吲哚生物碱进行了深入的研究^[1], 包括一些取代基效应及特征峰的指认。从药用植物小台灯 (学名 *Winchia calophylla* A. DC) 中分得的吲哚类 W-4, W-10, W-12, W-27 生物碱^[2]; 通过各种光谱分析和化学转化, W-4 和 W-27 分别检定是 echitamine 和 demethylechitamine; W-10 和 W-12 为新生物碱, 它们的结构分别定为 22-acetyl-Nb-demethyl-echitamine 和 22-acetyl-3-o-methyl-Nb-demethyl-echitamine。vincorine (简称 V) 的骨架与 W-4, W-10, W-12, W-27 的吲哚生物碱类同, 且其 ^{13}C 谱线已归属^[1,3], 故以 V 作为模型化合物, 并从中寻找一些规律, 为以后同类生物碱的结构测定提供一些参考。

实 验

^{13}C 信号的指认主要根据宽带去偶、DEPT、与模型化合物的碳谱比较、C—H COSY^[4] 及选择去偶^[5] 等结果。除 W-27 因样品量少, 在 AM-400 上测试外, 其余样品均在 AC-100 上测试。 ^{13}C NMR 共振频率为 25.13 MHz, 实验条件: Bruker AC 100 用谱宽为 6400 Hz, 数据点为 16 K, 90° 脉宽为 8 μs , 采样脉冲 45°, 脉冲重复时间 1s。Bruker AM 400 用谱宽为 20, 000 Hz, 数据点为 32 K, 90° 脉宽为 7.5 μs , 采样脉冲 45°, 脉冲重复时间 1s。C—H COSY 谱条件, 用 Bruker AM 400, 90° 脉宽 11 μs , 采用正交检测方式。F₂ 维谱宽 17241.38 Hz, 数据点 2 K, 数字分辨率为 16.83 Hz/点; F₁ 维谱宽 1515.15 Hz, 数据点 128 W, FT 时充另到 512 W, 数字分辨率为 5.92 Hz/点, 两维的窗函数均采用位移的 Sine-bell。

1987 年 10 月 20 日收到。 ** 中国科学院昆明植物所西双版纳热带植物园。

表 1 Vincorine, W-4, W-27, W-10 和 W-12 的 ^{13}C NMR 归属

碳位	Vincorine	W-4	W-27	W-10	W-12
2-C	97.9s	99.5s	96.6s	96.4s	101.2s
3-C	20.4t	68.2d	68.9d	68.0d	68.9d
5-C	56.1t	61.2t	53.7t	53.6t	62.1t
6-C	40.6t	30.1t	31.9t	29.6t	30.8t
7-C	57.3s	60.1s	60.6s	60.5s	61.2s
8-C	138.2s	129.3s	130.9s	130.5s	138.9s
9-C	112.1d	126.1d	126.4d	124.8d	126.4d
10-C	152.3s	118.4d	119.1d	119.2d	120.6d
11-C	111.7d	128.2d	128.7d	127.0d	126.4d
12-C	105.5d	110.1d	110.3d	110.4d	111.8d
13-C	143.6s	147.0s	148.2s	148.3s	147.2s
14-C	26.6t	41.4t	46.1t	46.0t	41.5t
15-C	34.8d	33.6d	36.5d	36.0d	35.8d
16-C	50.7d	55.1s	56.0s	53.9s	53.8s
17-C	173.5s	172.6s	174.4s	173.1s	171.8s
18-C	13.6q	14.4q	14.4q	14.8q	15.0q
19-C	123.2d	128.2d	124.9d	128.8d	131.4d
20-C	138.2s	132.0s	137.3s	137.2s	131.1s
21-C	58.1t	64.0t	67.1t	66.9t	65.8t
22-C	—	64.0	57.1	56.7	64.8
NMe	28.3	49.0t	—	—	—
OMe	54.9	—	—	—	50.1
COOMe	51.7	51.3	52.0	52.0	52.4
OCOMe	—	—	—	20.8	20.6
OCOMe	—	—	—	170.2	171.0

^{13}C 信号的化学位移均以溶剂为第二标准, CDCl_3 : 77ppm, DMSO: 39.5 ppm.

结果和讨论

^{13}C 化学位移的归属 五个吲哚生物碱的 ^{13}C 化学位移值分别列于表 1. 吲哚环的芳香核上如无取代基, 9-C, 10-C, 11-C 及 12-C 的化学位移值以 12-C 的为最高场, 这是因为接在芳核上的 N 原子的推电子效应, 引起其邻位屏蔽作用加强的结果. 而 9-C, 11-C 在最低场, 10-C 的化学位移值居于这两个碳的中间. 作者曾对样品 W-12 的 9-C, 10-C, 11-C 及 12-C 分别进行选择去偶实验, 实验结果为: 12-C 位于最高场(111.8 ppm), 11-C 位于最低场(129.6 ppm), 9-C 在 126.4 ppm, 10-C 的化学位移为 120.6 ppm. 这四个碳化学位移值的顺序与已报道的该类化合物的结果基本符合^[1,3]. “V”的芳核 10-C 上有推电子基团 OCH_3 取代, 使其邻位 9-C(111.7 ppm), 11-C(105.5 ppm) 向高场位移.

W-4, W-10, W-12 及 W-27 与“V”相比, 它们的 3-C 上均有电负性取代基 OH (或 OCH_3), 故使 3-C 的化学位移向低场位移了 ~48 ppm. 此外, 还可见 14-C 的化学位移也低移约 15—20 ppm, 显然是因为 OH 的 β 效应所致.

W-12 的 21-C 及 22-C 的化学环境十分相似, 因此它们的 ^{13}C 谱线十分接近, 65.8 及 64.8 ppm 分别是这两个 ^{13}C 的化学位移值. 根据 ^1H 谱结果得知, 21-C 上的两个不对价质子是一

图1 W-12的C—H COSY谱

对AB型峰,分别位于 $\delta 4.64$ 及 $\delta 3.56$ ppm; 22-C上两个质子不等价程度较小,但也是一对AB型峰,分别位于 $\delta 4.6$ 及 $\delta 4.5$ ppm. 再根据C—H COSY谱,可以确定与 $\delta 4.64$, $\delta 3.56$ ppm相对应的 ^{13}C 谱线是21-C,其化学位移值是65.8 ppm;与 $\delta 4.6$, $\delta 4.5$ ppm相对应的 ^{13}C 谱线是22-C,它的化学位移值是64.8 ppm.

参 考 文 献

- [1] Shamma, M.; Hindenlang, M. D., "Carbon-13 NMR Shift Assignments of Amides and Alkaloids", Plenum Press, New York, 1970, p. 205.
- [2] 李朝明,周韵丽,化学学报,待发表.
- [3] Proksa, B.; Uhrin, D.; Grossmann, E.; Voticky, Z., *Planta Med.*, 1987, 120.
- [4] Ad Bax, "Two-Dimensional Nuclear Magnetic Resonance in Liquids", Reidel, D. Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1982, p. 50
- [5] Wehrli, F. W.; Wirthlin, T., "Interpretation of Carbon-13 NMR Spectra", Heyden, London, 1976, p. 77.

Studies on ^{13}C NMR of the Four Indole Alkaloids of Deformyl Corynime Type

He Xiang* Li Chao-Ming Zhou Yun-Li

(Shanghai Institute of Materia Medica, Academia Sinica, Shanghai)

Abstract

The ^{13}C assignment of four indole alkaloids of deformyl corynime type, including two new compounds W-10, W-12 is reported. The effects of the substituents have been discussed. Due to the very similar environment of some carbon nuclei, the signals of them were identified by a hetero-nuclear C—H shift correlated spectrum or a selective decoupling technique.